Correction devoir maison n°5

Exercice 1

1) C' est le symétrique de B par rapport à A donc A est le milieu de $[BC']$ et donc $\overrightarrow{AC'} = -\overrightarrow{AB}$.

Avec cette égalité, on trouve que C' est le barycentre de $(A; 2)$ et de $(B; -1)$ avec $2 - 1 = 1 \neq 0$.

2) G , barycentre de $(A; -2)$, $(B; 1)$ et $(C; k)$ existe si $-2 + 1 + k \neq 0$, autrement dit si $k \neq 1$. Avec les conditions de l'énoncé : $k \in \mathbb{R} - \{-1; 1; 2\}$.

3) Pour $k \in \mathbb{R} - \{-1; 1; 2\}$:

A' est le barycentre de $(B; 1)$ et $(C; k)$ et G est le barycentre de $(A; -2)$, $(B; 1)$ et $(C; k)$ donc par associativité des barycentres, G est le barycentre de $(A; -2)$ et $(A'; 1 + k)$ (on a bien $-2 + 1 + k \neq 0$). Ceci montre que G appartient à la droite (AA') .

B' est le barycentre de $(A; -2)$ et $(C; k)$ donc par associativité du barycentre, G est le barycentre de $(B; 1)$ et $(B'; -2 + k)$ (on a bien $1 - 2 + k \neq 0$). Ceci montre que G appartient à la droite (BB') .

C' est le barycentre de $(A; 2)$ et $(B; -1)$ donc aussi de $(A; -2)$ et $(B; 1)$. Par associativité du barycentre, G est le barycentre de $(C; k)$ et $(C'; -1)$ (on a bien $k - 1 \neq 0$). Ceci montre que G appartient à la droite (CC') .

Finalement G appartient à (AA') , (BB') et (CC') et **les trois droites sont concourantes**.

4) Pour $k = 3$:

5) Pour $k = 1$:

a.

b. A' est le barycentre de $(B; 1)$ et $(C; 1)$ donc A' est le milieu de $[BC]$.

B' est le barycentre de $(A; -2)$ et $(C; 1)$ donc $\overrightarrow{AB'} = -\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$ et donc A est le milieu de $[B'C]$.

Dans le triangle BCB' , A' est le milieu de $[BC]$, A est le milieu de $[B'C]$ donc (AA') est parallèle à (BB') .

De même, dans le triangle BCC' , A est le milieu de $[BC']$ et A' est le milieu de $[BC]$ donc (AA') est parallèle à (CC') .

Finalement, **(AA') , (BB') et (CC') sont parallèles**.

Exercice 2

1) La racine évidente est 1 : $P(1) = -4 + 8 - 1 - 3 = 0$.

On peut donc factoriser P par $(x - 1)$ pour obtenir la forme $(x - 1)(ax^2 + bx + c)$. On développe et on identifie

les coefficients pour donner : $\begin{cases} a = -4 \\ b - a = 8 \\ c - b = -1 \\ -c = -3 \end{cases}$. La résolution du système donne : $\begin{cases} a = -4 \\ b = 4 \\ c = 3 \end{cases}$.

La factorisation est donc : $P(x) = (x - 1)(-4x^2 + 4x + 3)$.

Pour le signe de P , on étudie le signe de chacun des facteurs :

- Pour $x - 1$: la valeur annulante est 1
- Pour $-4x^2 + 4x + 3$, on calcule $\Delta = 64$ donc c'est du signe de $a = -4$ sauf entre les deux racines $x_1 = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{3}{2}$.

On obtient alors le tableau de signes :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
Signe de $x - 1$		-	0	+	+
Signe de $-4x^2 + 4x + 3$	-	0	+	0	-
Signe de $P(x)$	+	0	-	0	-

2) f est une fonction polynôme donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = -4x^3 + 8x^2 - x - 3 = P(x)$.

3) Pour trouver le tableau de variations de f , on a besoin du tableau de signe de f' donc de P qui est obtenue à la question précédente. D'où le tableau :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
Variations de f		$\nearrow \frac{95}{48}$	$\searrow -\frac{5}{6}$	$\nearrow -\frac{11}{16}$	$\searrow$

4) Pour déterminer une approximation affine locale de $f(2 + h)$ pour h proche de 0, il faut calculer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. Cette équation est de la forme $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$.

Or $f'(2) = -4 \times 2^3 + 8 \times 2^2 - 2 - 3 = -5$ et $f(2) = -2^4 + \frac{8}{3} \times 2^3 - \frac{2^2}{2} - 3 \times 2 + 1 = -\frac{5}{3}$

D'où $y = -5(x - 2) - \frac{5}{3}$ et en développant : $y = -5x + \frac{25}{3}$.

$f(2 + h) \approx -5(2 + h) + \frac{25}{3} \approx -5h - \frac{5}{3}$.

5) On a besoin de $f(2) = -\frac{5}{3}$ et $f(-2) = -\frac{97}{3}$

a. $f(x) \in \left[-\frac{97}{3}; \frac{95}{48}\right]$

b. f possède deux maximums locaux en $-\frac{1}{2}$ et en $\frac{3}{2}$ et un minimum local en 1.

c. f possède un majorant atteint en $-\frac{1}{2}$ et un minorant atteint en -2 .

Exercice 3

Chaque information fournie doit être traduite en terme de propriétés vérifiées par la fonction f . On résout ensuite un système d'équations.

- C_f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 20 : $f(0) = 20$ donc $\boxed{d = 20}$.
- C_f passe par le point $A(-1; 18)$ et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 3 : $f(-1) = 18$ et $f'(-1) = 3$.

On doit donc exprimer $f'(x)$ en fonction de a, b et c : $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

$f(-1) = 18$ donc $-a + b - c + 20 = 18$ donc $\boxed{-a + b - c = -2}$.

$f'(-1) = 3$ donc $\boxed{3a - 2b + c = 3}$.

- C_f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0 : $f'(0) = 0$. Donc $\boxed{c = 0}$.

On est donc ramené au système de deux équations à deux inconnues : $\begin{cases} -a + b = -2 \\ 3a - 2b = 3 \end{cases}$.

On résout soit par substitution, soit par combinaison linéaire pour trouver : $\begin{cases} a = -1 \\ b = -3 \end{cases}$.

Finalement $\boxed{f: x \mapsto -x^3 - 3x^2 + 20}$.